



繁體版

雲南白藥

(國家絕密方) 解密

宋友諒／著



目錄

前言	4
雲南白藥的歷史和知識產權	5
雲南白藥療效及適應症	8
誇大宣傳，不實資料	12
雲南白藥系列產品法律檢查	21
一、雲南白藥	22
二、雲南白藥膠囊	25
三、雲南白藥酊	25
四、雲南白藥創可貼	25
五、雲南白藥氣霧劑	26
六、雲南白藥膏	27
七、雲南白藥散劑	27
雲南白藥牙膏	30
結束語	36
附圖	38
我的作品：一、從碳酸鈣變成國家絕密處方的過程	40
二、《雲南白藥》書評	50
參考資料	60

前言

一九五九年，作者在南京藥學院畢業前實習，在南京市中醫院圖書館，看到了醫藥衛生快報上，雲南白藥祕方，一九六二年，加強基層技術力量，我由北京醫藥工業研究院，調到昆明制藥廠，試驗室主任王技師給我的答復是：雲南白藥成分不保密，告訴了你成分，你也做不出來，保密的是生產工藝，是藥廠試驗後做出來的，文化革命時期，雲南白藥工藝操作規程，放在中心實驗室臺上，無人保管，我也看過了，但是在二〇一三年，湖南羅秋林律師，以侵犯消費者知情權理由，將雲南白藥的生產藥廠，告到法院，引起我的注意，之後收集我寫過的文章（參考資料 1、2）並買了雲南白藥產品，分析研究，形成此書，供雲南白藥系列產品的消費者，打假勇士，藥品管理部門，質量監督部門及對此產品有興趣的人士閱讀研究。



雲南白藥的歷史和知識產權

民國時期，雲南各地藥店，賣一種紙包的白色粉末，是民間祕方，用於治療跌打損傷，因為藥品是白色的，叫白藥，產於雲南，這就是雲南白藥名字的來源。

其藥物組成有三七，稱傷科聖藥，有止血、散瘀，消腫止痛的作用，還有獨定子（金鐵鎖）、草烏，有止痛作用，及重樓，是賦形劑，在一九五五年的雲南科技展覽會上，這個雲南白藥獲一等獎。

雲南名醫曲煥章，也配製雲南白藥，稱「百寶丹」，裡面加了一粒小紅丸，稱保險子，有保險子的，表示由曲煥章配製的，所以，雲南白藥的知識產權屬於雲南中醫和藥房，百寶丹的知識產權，屬於曲煥章的，曾澤生的知識產權是白藥精（參考資料 6）這三種白藥，成分不相同的。

一九三八年曲煥章去世之後，百寶丹停產。

一九四九年，雲南解放時，還有二十多家生產雲南白

雲南白藥 解密

藥，五二年整頓之後，還有十三家生產雲南白藥，所以雲南白藥的知識產權屬於雲南醫藥界，同曲煥章沒有關係。

那麼什麼時候雲南白藥和曲煥章百寶丹，合二爲一混爲一談的呢？

從一九五五年開始的，當時全國開展獻祕方運動，曲煥章之子曲嘉瑞，獻出了曲煥章祕方，稱百寶丹，由昆明聯合藥廠生產，曲煥章妻子繆蘭英，也獻出了祕方，稱雲南白藥（原名曲煥章百寶丹）由昆明藥廠生產，1962 年外包裝重新設計，去了括弧中的八個字，稱雲南白藥，這樣把雲南各地中醫和藥房的知識產權，全部給了曲煥章一人所有，典型的張冠李戴了。

關於雲南白藥和曲煥章百寶丹，二者混爲一談，從批准文號上也看到了這一情況，請見本文雲南白藥法律檢查項下，雲南白藥批准文號 Z53020792，z 代表中藥類，53 代表雲南省地區的代號。02 代表 2002 年又核發了一次批准文號 0792 是順序，那麼一九五三年的雲南白藥成分是三七、草烏、重樓、獨定子（金鐵鎖），當時曲煥章百寶丹 1951 年獲一等獎，取樣化驗是碳酸鈣，作爲假藥登雲南日報取締，這個批准文號同曲煥章的白藥沒有關係，當時正值工商業社會主義改造，私人老闆進入昆明聯合藥



廠，生產百寶丹和白藥精，昆明藥廠生產的是雲南白藥（原名曲煥章百寶丹），用的批准文號是 1953 年給的文號，但是成分不同了，是三七、草烏、重樓、獨定子，麝香，冰片，披麻草，朱砂，是繆蘭英獻的祕方，成分不同，用了相同的批准文號，於是開始了牛皮越吹越大的吹牛皮，吹到了雲南地方誌寫成黨和國家經濟領域中最高機密，雲南省檔案館的地方史資料中，有這樣介紹的，雲南白藥為雲南人曲煥章創制，專門用於傷科治療的中成藥散劑，至今已有一百多年歷史，其處方仍然是中國政府經濟領域的最高機密（404 頁）。繆蘭英獻的祕方，她是外行，並不知道怎麼配製，由曲家工人李瓊華教他的，三七用量特別大，要濃縮處理，曲煥章沒有這個設備的，曲煥章之子曲嘉瑞，之女曲竹林，一直聲稱繆蘭英獻的祕方是假的，例如，為什麼有麝香，工商局審定價格時價格不對，繆蘭英加了麝香一味，日本牙膏粉中有冰片氣味，於是配方中加了冰片一味，本人懷疑，繆蘭英抄了公開的獲獎的雲南白藥處方，加了一粒小紅丸，所以她把三七劑量抄錯了，用量特別大。

雲南白藥療效及適應症

一九五九年《醫藥衛生快報》第十七期 258～259 頁，這是產品投放市場之前，由雲南省第一人民醫院，作臨床試驗，該文摘錄如下：雲南白藥（原名曲煥章百寶丹）系採用雲南特製藥材配製的民間驗方之一，在臨床應用上，的確有很大療效，今將雲南省第一人民醫院內科，對雲南白藥在臨床上應用體會及結合過去的經驗，綜合介紹如下：

雲南白藥主要的藥物有：三七，重樓、獨定子、草烏、披麻草、冰片、麝香、珠砂等混合而成。

服法（一般用法及注意點）

- (1) 凡因刀槍跌打諸傷，無論輕重，有出血者，用開水調服，若瘀血腫痛，及未出血者，則宜用酒調服。
- (2) 婦科各症，均宜以酒調服。
- (3) 凡毒瘡初起，除內服外，並宜用白藥少許，以酒調勻，塗患處，如已化膿，只需內服。



用量（一般用法）

(1) 不論上述何症，成人每次需用量為 0.2~0.3 克，如病情較重及身體健康者，可酌量增服，但每次最多不可超過 0.5 克。

(2) 凡小孩，二歲以內每次服 0.03 克，五歲以內服 0.06 克。

禁忌

凡在服用白藥期內，忌食蠶豆、魚類、酸冷等，孕婦忌服。

作者對雲南白藥用法介紹

為了便於臨床觀察及總結，對一般成人，每次 0.2 克，一日三次，小孩可參照以上一般用法。

雲南白藥的主要作用

- (1) 清熱解毒
- (2) 消炎散腫
- (3) 止血鎮痛
- (4) 防腐生肌
- (5) 化瘀活血
- (6) 補血生新